


BIOLOGICKÁ BEZPEČNOST NA FARMÁCH

Pro prevenci ileitidy

VÍTE, ŽE SE ILEITIDA VYSKYTUJE NA VŠECH FARMÁCH?



URČUJÍCÍ FAKTORY LAWSONIA INTRACELLULARIS



INTENZIVNÍ
vyučování
s výkaly

až
14
týdnů

PRODLOUŽENÁ
perzistence
vyučování

10⁴

L. intracellularis

NÍZKÁ
minimální infekční
dávka

>**2**
týdny

DLOUHÁ
doba přežití ve vnějším
prostředí



VYSOKÁ
pravděpodobnost
reinfekce

DOPORUČENÍ

- Maximalizujte úklid a dezinfekci
- Trvale dodržujte program kontroly hlodavců
- Po propuknutí choroby přerušete výrobu
- Zvažte vakcinaci (vhodnější je individuální aplikace)

- Poradte se se svým veterinářem, pokud zaznamenáte:
 - Průjem
 - Zpožděný růst
 - Vzrůstající nevyrovnanost šarží

Univerzální řešení pro všechny farmy neexistuje.

Nejvhodnější způsob kontroly ileitidy je nutno vybrat na míru každému chovu.

KLÍČEM K MINIMALIZACI ZTRÁT JE PREVENCE